

Programa de implante recomendado por Elanco para plantas de ganadería intensiva

Bueyes

Estrategia conservadora
de comercialización de ganado: Cuadrícula

Peso inicial libras	Días proyectados	Primer implante	Segundo implante	Fecha límite del implante (días antes de la comercialización)
400	240	Encore®	TE-S	70-80
450	220	Encore	TE-S	70-80
500	210	E-S	TE-S	70-80
550	190	E-S	TE-S	70-80
600	170	E-S	TE-S	70-80
650	160	TE-S	ninguno	-
700	150	TE-S	ninguno	-
750	140	TE-S	ninguno	-
800	120	TE-S	ninguno	-
> 850	100	TE-S	ninguno	-

Estrategia moderada
de comercialización de ganado: Cuadrícula

Peso inicial libras	Días proyectados	Primer implante	Segundo implante	Fecha límite del implante (días antes de la comercialización)
400	240	Encore	TE-S	70-80
450	220	Encore	TE-S	70-80
500	210	TE-IS	TE-S	70-80
550	190	TE-IS	TE-S	70-80
600	170	TE-IS	TE-S	70-80
650	160	TE-IS	TE-S	70-80
700	150	TE-IS	TE-S	70-80
750	140	TE-IS	TE-S	70-80
800	120	TE-S	ninguno	-
> 850	100	TE-S	ninguno	-

Estrategia agresiva
de comercialización de ganado: Vivo

Peso inicial libras	Días proyectados	Primer implante	Segundo implante	Fecha límite del implante (días antes de la comercialización)
400	240	TE-200	TE-200	70-80
450	220	TE-200	TE-200	70-80
500	210	TE-200	TE-200	70-80
550	190	TE-200	TE-200	70-80
600	170	TE-200	TE-200	70-80
650	160	TE-200	TE-200	70-80
700	150	TE-200	TE-200	70-80
750	140	TE-200	TE-200	70-80
800	120	TE-200	ninguno	-
> 850	100	TE-200	ninguno	-

Holstein y terneros alimentados

Peso inicial libras	Días proyectados	Primer implante	Segundo implante	Fecha límite del implante (días antes de la comercialización)
250-450	240-370	Encore	TE-S	100
500	210	TE-IS	TE-S	70-80
550	190	TE-IS	TE-S	70-80
600	170	TE-IS	TE-S	70-80
650	160	TE-IS	TE-S	70-80
700	150	TE-IS	TE-S	70-80
750	140	TE-IS	TE-S	70-80
800	120	TE-S	ninguno	-
> 850	100	TE-S	ninguno	-

Tylan® es una marca registrada para la marca de tilosina de Elanco. Elanco®, Component® con Tylan®, Encore, HeifermaX, Carne bovina de valor completo y la barra diagonal son marcas registradas de Eli Lilly and Company, sus subsidiarias o filiales. © 2014 Elanco Animal Health. OPTA 32782-2

USBUMUL00923

Novillas

Estrategia conservadora
de comercialización de ganado: Cuadrícula

Peso inicial libras	Días proyectados	Primer implante	Segundo implante	Fecha límite del implante (días antes de la comercialización)
400	240	Encore	TE-H	70-80
450	220	Encore	TE-H	70-80
500	210	E-H	TE-H	70-80
550	190	E-H	TE-H	70-80
600	170	E-H	TE-H	70-80
650	160	TE-H	ninguno	-
700	150	TE-H	ninguno	-
750	140	TE-H	ninguno	-
800	120	TE-H	ninguno	-
> 850	100	TE-H	ninguno	-

Estrategia moderada
de comercialización de ganado: Cuadrícula

Peso inicial libras	Días proyectados	Primer implante	Segundo implante	Fecha límite del implante (días antes de la comercialización)
400	240	Encore	TE-H	70-80
450	220	Encore	TE-H	70-80
500	210	TE-IH	TE-H	70-80
550	190	TE-IH	TE-H	70-80
600	170	TE-IH	TE-H	70-80
650	160	TE-IH	TE-H	70-80
700	150	TE-IH	TE-H	70-80
750	140	TE-200	ninguno	-
800	120	TE-200	ninguno	-
> 850	100	TE-200	ninguno	-

Estrategia agresiva
de comercialización de ganado: Vivo

Peso inicial libras	Días proyectados	Primer implante	Segundo implante	Fecha límite del implante (días antes de la comercialización)
400	240	Encore	TE-200	70-80
450	220	Encore	TE-200	70-80
500	210	TE-H	TE-200	70-80
550	190	TE-H	TE-200	70-80
600	170	TE-H	TE-200	70-80
650	160	TE-H	TE-200	70-80
700	150	TE-H	TE-200	70-80
750	140	TE-200	ninguno	-
800	120	TE-200	ninguno	-
> 850	100	TE-200	ninguno	-

Nota: El TE-200 puede utilizarse para el implante límite en programas más agresivos. Todos los implantes deberán contener una capa antibacterial o gránulo de Tylan®.



FULL VALUE BEEF

Novillas alimentadas con HeifermaX®.

La etiqueta contiene información completa sobre el uso, incluidas las precauciones y advertencias. Siempre lea, comprenda y siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.

Implantes

Administre una dosis en la oreja de manera subcutánea según las indicaciones de la

HeifermaX: Ganado de cría intensiva (feedlot)

Para incrementar la tasa de engorda, mejorar la eficacia de la alimentación y suprimir el estro (calor): Suministre de 227 a 900 g (0.5 a 2.0 lb) de alimento por cabeza por día en una alimentación medicada de tipo C para administrar de 0.25 a 0.5 mg de acetato de melengestrol por cabeza por día.

